

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по применению лекарственного препарата для медицинского применения**

**Эспумизан®**

**Регистрационный номер:**

**Торговое патентованное название препарата:** Эспумизан®

**Международное непатентованное название:** Симетикон

**Лекарственная форма:** капсулы

**Состав:**

**В одной капсуле содержится:**

*Действующее вещество:* симетикон - 40,0 мг

*Вспомогательные вещества:* желатин - 22,47 мг, глицерол 85 % - 9,67 мг, метилпарагидроксibenзоат - 0,28 мг, краситель хинолиновый желтый, Е 104 - 0,10 мг, краситель солнечный закат желтый, Е 110 - 0,0024 мг.

МИНЗДРАВ РОССИИ

180722

СОГЛАСОВАНО

**Описание**

Круглые или почти круглые, мягкие, желтые капсулы из желатина со швом и гладкой поверхностью.

*Содержимое капсулы:* бесцветная, вязкая, полупрозрачная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** ветрогонное средство

**Код АТХ :** А03АХ13

**Фармакологическое действие**

**Фармакодинамика**

Эспумизан® - препарат, уменьшающий количество газов в кишечнике. Действующее вещество - симетикон обладает поверхностной активностью и способностью снижать поверхностное натяжение на границе раздела сред жидкость/газ. При этом происходит слияние пузырьков газа и разрушение пены, вследствие чего высвободившийся газ получает возможность всасываться или выводиться естественным путём под воздействием перистальтики кишечника. Применение препарата Эспумизан® для подготовки к

144726

проведению диагностических исследований предупреждает возникновение дефектов изображения, вызываемых пузырьками газа.

### **Фармакокинетика**

Симетикон химически инертен, после перорального приема не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и действует только в его просвете. Не влияет на ферменты и микроорганизмы, присутствующие в ЖКТ. Выводится в неизменённом виде.

### **Показания к применению**

- избыточное образование и скопление газов в ЖКТ (метеоризм, синдром Ремхельда, аэрофагия, повышенное газообразование в послеоперационном периоде);
- подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (ультразвуковые, рентгенологические исследования и др.);
- симптомы избыточного газообразования, вызванного функциональной диспепсией;
- острые отравления моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества (в качестве пеногасителя).

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- кишечная непроходимость;
- детский возраст до 18 лет.

### **Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания**

Препарат Эспумизан® можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

*При жалобах, связанных с избыточным газообразованием:*

Взрослым по 2 капсулы 3 - 5 раз в сутки, можно с небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и при необходимости перед сном. Продолжительность курса лечения зависит от наличия симптомов повышенного газообразования. При необходимости препарат Эспумизан® можно применять в течение длительного периода времени.

*Подготовка к диагностическим исследованиям:* по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, и утром в день исследования 2 капсулы, не запивая водой.

*В качестве пеногасителя при отравлениях моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества:* разовая доза для взрослых составляет 10 - 20 капсул дозирование зависит от тяжести интоксикации.

#### *Педиатрическая популяция*

Препарат Эспумизан® противопоказан у детей в возрасте до 18 лет. Другие лекарственные формы и дозировки могут удовлетворять потребности данной группы.

#### **Побочное действие**

Побочных эффектов при приеме препарата Эспумизан® не наблюдалось.

Возможно развитие аллергических реакций на компоненты препарата.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимого взаимодействия препарата Эспумизан® с другими лекарственными препаратами не установлено.

#### **Передозировка**

Передозировка препарата Эспумизан® маловероятна из-за химической и физиологической инертности препарата.

#### **Особые указания**

У людей с повышенной чувствительностью к компонентам препарата (метилпарагидроксибензоат и краситель солнечный закат желтый (E 110)) возможно возникновение реакций гиперчувствительности немедленного типа, а также реакций гиперчувствительности замедленного типа. При возникновении любых аллергических реакций прием препарата следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.

#### **Влияние на способность к управлению автотранспорта и работу с механизмами**

Препарат Эспумизан® не оказывает влияния на быстроту психомоторных реакций и способность к восприятию или оценки ситуации.

**Форма выпуска**

Капсулы 40 мг.

По 25 капсул в блистер из ПВХ/фольга алюминиевая.

По 1, 2 или 4 блистера в картонную пачку вместе с инструкцией по медицинскому применению.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Лекарственное средство хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности**

5 лет.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Каталент Германия Эбербах ГмбХ

Гаммельсбахер Штрассе 2

69412 Эбербах

Германия


**Адрес Московского Представительства фирмы:**

123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, БЦ «Башня на Набережной», Блок Б,  
тел. (495) 785-01-00, факс (495) 785-01-01

Руководитель отдела регистрации и претензий



Харченко Н.Б.



144726



Всего прошнуровано,  
прономеровано и скреплено  
печатью листов

5

